

(1 ن)

يتطلب إنتاج الطاقة الكهربائية داخل محطة نووية استعمال وقود أحفوري.	
يشكل استعمال المواد الإشعاعية النشاط في المجال الطبي مصدرًا للتلوث الإشعاعي.	
إثر حادثة نووية مثل حادثة تشير نوبيل، يمكن للعناصر إشعاعية النشاط أن تنتشر في الهواء والتربة والمياه.	
يمكن أن يؤدي التعرض للإشعاعات المؤينة، الناتجة عن تفتت العناصر المشعة، إلى الإصابة بالسرطان.	4

III. يوجد اقتراح واحد صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4. انقل(ي) الأزواج الآتية على ورقة تحريرك ثم اكتب(ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراح الصحيح.

(¿2) . (.... 4) ; (.... 3) (.... 2) ; (.... 1)

1. أوزون التروبوسفير هو غاز: 2. يعتمد انتاج الطاقة الجيوحرارية على: أ. احتراق الفحم والنفط. أ. يُلوّث الهواء ويرفع من الاحتباس الحراري. ب. احتراق الكتلة الحية. ب. يُلوّث الهواء ويخفض من الاحتباس الحراري. ج. يحمى الكائنات الحية بفعل امتصاصه للأشعة تحت الحمراء . ج. استعمال حرارة الاحتباس الحراري. د. استعمال الحرارة الباطنية للأرض. د. يحمى الكائنات الحية بفعل امتصاصه للأشعة فوق البنفسجية. 4. التثمين الأمثل للنفايات المعدنية يتمثل في: 3. التراكم البيولوجي هو ارتفاع تركيز الملوثات في: أ. طمر ها. أ. أو ساط طبيعية مختلفة. ب. الأوساط الطبيعية حسب الزمن. ب. حرقها. ج. أنسجة الكائنات الحية. ج. إعادة تدوير ها. د. أنسجة الكائنات الحية من جيل إلى آخر. د. استعمالها من اجل انتاج الميثان.

IV. أنقل (ي) الأزواج (1،....) و (2،) و (3،) و (4،)، ثم أنسب(ي) لكل رقم من أرقام المجموعة 1 الحرف المناسب له من بين أحرف المجموعة 2. (1ن) الصفحة 2 NS 34

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2023 - الموضوع - مادة: علوم الحياة والأرض- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيانية

المجموعة 2: التقنية المستعملة.		
انتاج الميثان.	١	
انتاج السماد العضوي.	ŀ	
الترميد.	ા	
الفرز.	7	
الطمر.	4	


	المجموعة 1: مبدأ تدبير النفايات.
1	دفن النفايات في مطرح مراقب.
2	حرق النفايات في فرن ذو درجة حرارة مرتفعة.
3	تخمر النفايات العضوية من أجل إنتاج البيوغاز.
4	تحلل النفايات العضوية من أجل انتاج مخصبات التربة.
4	تحلل النفايات العضوية من أجل انتاج مخصبات التربة.

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتعبير الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين 1 (5 نقط)

تتميز متلازمة neuropathie, ataxie, rétinite pigmentaire) NARP) بمجموعة من الأعراض مثل ارتفاع تركيز الحمض اللبني في الدم والتعب العضلي. من أجل تفسير أصل هذه الأعراض نقدم المعطيات الآتية:

• المعطى 1: مكنت إحدى الدراسات من قياس تركيز كل من الحمض اللبني وحمض البيروفيك في الدم، عند شخصين، أحدهما سليم والأخر مصاب بمتلازمة NARP. يبين الشكلان (أ) و (ب) من الوثيقة 1 نتائج هذه الدراسة، ويبين الشكل (ج) من نفس الوثيقة نتائج دراسة أخرى مكنت من مقارنة بعض خاصيات خلايا شخص مريض وخاصيات خلايا شخص سليم.



- باستغلال معطیات الوثیقة 1:
- أ. قارن(ي) النتائج المحصلة عند الشخص المريض بالنتائج المحصلة عند الشخص السليم. (1 ن) ب. فسر(ي) قيمتي تركيز كل من حمض البيروفيك والحمض اللبني الملاحظة عند الشخص المريض. (1.25 ن)
- ATP %
 ATP imid with O2 UA ...

 المستهاك UA ...
 UA ...

 الوسط 1 مرتفعة
 0,301 0,179

 الوسط 2 الوسط 2 الوشقة 2 الوشيقة 2 الوثيقة 2 الوثيقة 3 ال


• المعطى 2: أنجزت قياسات لبعض خاصيات الميتوكندريات باستعمال وسطين ملائمين، أحدهما يحتوي على ميتوكندريات شخص سليم [الوسط 1) والأخر يحتوي على ميتوكندريات شخص مريض (الوسط 2). تقدم الوثيقة 2 النتائج المحصلة

2. باستغلال معطيات الوثيقة 2، استخرج(ي) الاختلافات الملاحظة بين خاصيات ميتوكندريات الشخص المريض مقارنة بخاصيات ميتوكندريات الشخص السليم. (0.75 ن)

الصفحة 3 NS 34

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2023 - الموضوع - مادة: علوم الحياة والأرض- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيانية

• المعطى 3: تمثل الوثيقة 3 نموذجا مبسطا لاشتغال السلسلة التنفسية واشتغال ATP سنتاز عند شخص سليم و عند شخص مريض (مصاب بمتلازمة NARP)




- 3. باستغلال معطيات الوثيقة 3، فسررى) النتائج الملاحظة عند الشخص المريض (الممثلة في الوثيقة 2). (1ن)
- 4. بالاعتماد على المعطيات السابقة وعلى معارفك، بين(ي) العلاقة بين المسالك الاستقلابية لإنتاج الطاقة والأعراض الملاحظة عند الشخص المصاب بـ NARP. (1ن)

التمرين 2 (2.5 نقط)

يعتبر فرط كوليسترول الدم العائلي (HCF) مرضا وراثيا يتميز بارتفاع غير عادي لنسبة الكولسترول في الدم. من أجل تفسير الأصل الوراثي لأحد أشكال هذا المرض نقدم المعطيات الآتية:

• المعطى 1: يُنقل الكولسترول في الدم على شكل جزيئات تسمى Low Density Lipoprotein) LDL). يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 رسما مبسطا لإحدى جزيئات LDL.


من أجل تحديد مصير LDL في المستوى الخلوي، تم زرع خلايا شخص سليم وخلايا شخص مصاب بمرض HCF، في وسط ملائم بوجود LDL مشعة. تبين الوثيقة 1 تطور كمية LDL (التي تم تقدير ها من خلال النشاط الإشعاعي) داخل الخلايا و على سطحها، عند شخص سليم (الشكل ب) و عند شخص مريض (الشكل ج).



• المعطى 2: لجزيئات LDL القدرة على الارتباط بمستقبلات غشائية ذات طبيعة بروتينية. تمثل الوثيقة 2 دور هذه المستقبلات في دخول جزيئات LDL إلى الخلايا، عند شخص سليم (الشكل أ) وعند شخص مريض (الشكل ب).



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2023 - الموضوع - مادة: علوم الحياة والأرض- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية



- 1. اعتمادا على الوثيقة 1، قارن(ي) النتائج المحصلة عند الشخص المريض بالنتائج المحصلة عند الشخص السليم. (0.5 ن) . اعتمادا على المعطيات السابقة ومعطيات الوثيقة 2، بين(ي) العلاقة بروتين صفة. (0.5 ن)
- المعطى 3: يتحكم في تركيب مستقبلات LDL مورثة تسمى LDL. تقدم الوثيقة 3 جزء من اللولب غير المنسوخ للحليل LDL العادي وآخر للحليل غير العادي المسؤول عن مرض HCF. وتقدم الوثيقة 4 مستخلصا من جدول الرمز الوراثي.

29 30 31 32 33 34 35

AGA-AAC-GAG-TTC-CAG-TGC-CAA

AGA-AAC-GAG-TTC-TAG-TGC-CAA

منحى القراءة

رقم الثلاثية : جزء من الحليل LDLR العادي : جزء من الحليل LDLR غير العادي :

الوثيقة 3

UAG	GAA	UCC	AAU	AGG	UUU	CAA	UGC	الوحدات الرمزية
UGA	GAG	UCG	AAC	AGA	UUC	CAG	UGU	
بدون معنى	Glu	Ser	Asn	Arg	Phe	Gln	Cys	الأحماض الأمينية

الوثيقة 4

3. بالاعتماد على الوثيقتين 3 و 4، أعط(ي) متتالية ARNm ومتتالية الأحماض الأمينية المقابلة لكل من جزء الحليل العادي وجزء الحليل غير العادي ثم فسر (ي) الأصل الوراثي لمرض HCF. (1.5).

التمرين 3 (2.5 نقط)

في إطار دراسة انتقال الصفات الوراثية عند ثنائيات الصيغة الصبغية، نقترح دراسة انتقال صفتين وراثيتين عند القطط: - لون الزغب: لون برتقالي أو لون أسود أو ثنائي اللون - قد الزغب: زغب طويل أو زغب قصير. تم إنجاز تزاوجين بين أبوين من سلالتين نقيتين.

الجيل المحصل عليه	الأبوان	
- 50% ذكورا بلون أسود وزغب قصير.	أنثى بلون أسود كر بلون برتقالي	التزاوج 1
- 50% إناثا ثنائية اللون وذات زغب قصير.	وزغب قصير 🔏 وزغب طويل	

1. باستثمار نتائج هذا التزاوج حدد(ي) نوع السيادة بالنسبة لكل مورثة، علل(ي) جوابك. (0.5 ن)

قصد تفسير العلاقة بين المورثتين المدروستين، تم اقتراح الفرضيتين الآتيتين:

- الفرضية 1: المورثتان المدروستان مرتبطتان ومحمولتان على الصبغي X.
- الفرضية 2: المورثتان المدروستان مستقلتان، إحداهما محمولة على الصبغي X والأخرى محمولة على صبغي لاحنس

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2023 - الموضوع - مادة: علوم الحياة والأرض- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية

من أجل التحقق من الفرضيتين المقترحتين، أنجز تزاوج ثان بين قطط من سلالتين نقيتين. يقدم الجدول الآتي النتائج المحصلة.

الجيل المحصل علية	الأبُوان	
- 50% ذكورا بلون برتقالي وزغب قصير.	ذكر بلون أسود 🔪 أنثى بلون برتقالي	التزاوج 2
- 50% إناثا ثنائية اللون وذات زغب قصير.	وزغب قصير $^{m{\Lambda}}$ وزغب طويل	

- 2. بالاعتماد على النزاوجين، بين(ي) أن المورثتين المدروستين مستقاتين، ثم تحقق(ي) من الفرضيتين المقترحتين. (1 ن)
 - 3. مستعينا بشبكة التزاوج، أنجز(ي) التفسير الصبغى لنتائج التزاوج 2. (1ن)
 - ✓ استعمل(ي) الرموز الأتية:
 - ا أو ${f n}$ بالنسبة للحليل المسؤول عن اللون الأسود و ${f O}$ أو ${f a}$ بالنسبة للحليل المسؤول عن اللون البرتقالي.
 - f L أو f 1 بالنسبة للحليل المسؤول عن الزغب الطويل و f R أو f r بالنسبة للحليل المسؤول عن الزغب القصير.

التمرين 4 (5 نقط)

تتضمن السلاسل الجبلية عدة مؤشرات تكتونية وصخرية تدل على مراحل تشكلها. من أجل إبراز أهمية هذه المؤشرات في استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة ما، نقدم المعطيات الأتية:

- المعطى الأول: تقع كتلة Arize في سلسلة جبال البيريني Pyrénées (سلسلة جبلية حديثة).
 - يقترح الباحثون أن منطقة Arize قد عرفت اصطداما بين قشرتين قاريتين. تقدم الوثيقة 1 مقطعا جيولوجيا مبسطا لهذه المنطقة.
- 1. انطلاقا من معطيات الوثيقة 1، استخرج(ي) المؤشرات التكتونية لهذا الاصطدام ثم اعط(ي) دلالتها. (0.5 ن)
- المعطى الثاني: بهدف التأكد من اقتراح الباحثون، أنجزت دراسة على خمسة صخور من كتلة Arize. تقدم الوثيقة 2 مستخلصا مبسطا من خريطة جيولوجية لهذه الكتلة. ويبين جدول الوثيقة 3 بعض المعادن المؤشرة لصخور هذه الكتلة.

		المعادن المؤشرة			
R5	R4	R3	R2	R1	العددان الموسرة
-	-	-	-	+	كلوريت
+	+	+	+	-	بيوتيت
-	-	+	+	+	اندلوسيت
-	-	+	+	-	موسكوفيت
+	+	-	-	-	سليماثيت
+	+	-	-	-	فلدسبات بوتاسي

- +: المعدن موجود
- المعدن غير موجود


2 Km	
Cap de Com (1504 m)	pets
الغنايس (R4)	(R1) الشيست
الميكماتيت (R5) الوثيقة 2	(R2) الميكاشيست (R3) (R3) الميكاشيست (R3)

الوثيقة 3


الصفحة 6 NS 34

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2023 - الموضوع - مادة: علوم الحياة والأرض- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيانية

- 2. انطلاقا من معطيات الوثيقة 3، حدد(ي) التغيرات التي طرأت على التركيب العيداني، عند الانتقال من الصخرة R1 الى R2 ، وعند الانتقال من الصخرة R3 الى R4. (1 ن)
- المعطى الثالث: اعتمادا على التركيب العيداني لصخور هذه المنطقة، تمكن الباحثون من تحديد ظروف الضغط ودرجة الحرارة التي أدت إلى تكون هذه الصخور. تقدم الوثيقة 4 تموضع صخور هذه الكتلة حسب ظروف الضغط ودرجة الحرارة، ومجالات استقرار بعض المعادن المؤشرة.



- 3. باستغلالك لمعطيات الوثيقتين 3 و 4، فسر(2) التغيرات الملاحظة في التركيب العيداني عند الانتقال من الصخرة R1 الى R2 ، وعند الانتقال من الصخرة R3 الى R4. (1.5)
 - المعطى الرابع: تتميز صخور الميكماتيت (R5) بوجود بنيتين: بنية تشبه صخرة الغنايس وبنية تشبه صخرة الكرانيت (صخرة صهارية).
 - 4. بالاعتماد على الوثيقة 4 و على معارفك، و علما أن الميكماتيت تنحدر من الغنايس، فسر (ي) كيفية تشكل الميكماتيت. (1 ن)
- المعطى الخامس: تحتفظ الصخور من R1 إلى R5، من خلال تركيبها العيداني، على ذاكرة لظروف الضغط ودرجة



- الحرارة التي عرفتها منطقة Arize. قصد تفسير تطور هذه الظروف، تبين الوثيقة 5 درجة الحرارة السعيرية لمناطق مختلفة من الكرة الأرضية.
- جاستغلال الوثيقتين 4 و5، استخرج(ي) ظروف كل من الضغطودرجة الحرارة التي خضعت لها الصخور R1 و R3 و R5 ثم علل(ي) أن هذه المنطقة عرفت ظاهرة اصطدام. (10)

*** § انتهى ك ***